

Практика по алгоритмам #2

Тема: суммы, циклы

9 сентября

Собрано 13 сентября 2014 г. в 20:47

Содержание

1	Теория	2
2	Задачи про суммы	3
3	Задачи про циклы for	3
4	Домашнее задание	4
4.1	Задачи про циклы for	4
4.2	Суммы	5

1 Теория

- **Арифметическая прогрессия**

$$\sum_{n=a}^b n = \frac{(b+a)(b-a+1)}{2}$$
$$\sum_{n=1}^a n = \frac{a(a+1)}{2}$$

- **Геометрическая прогрессия**

$$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{q^{n+1}-1}{q-1}$$

При $-1 < q < 1$: $\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{-1}{q-1} = \frac{1}{1-q}$

Если $q = \frac{1}{1+\varepsilon}$: $1 - q = \frac{\varepsilon}{1+\varepsilon} \approx \varepsilon \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} (1 + \varepsilon)^{-k} \approx \frac{1}{\varepsilon}$

- **Сумма гармонического ряда**

$$1 + \lfloor \log_2 n \rfloor \geq \underbrace{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}_1 + \underbrace{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}}_1 + \underbrace{\frac{1}{8} + \dots}_{1 \dots} \geq$$
$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \dots \geq$$
$$\frac{1}{1} + \underbrace{\frac{1}{2}}_{1/2} + \underbrace{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}}_{1/2} + \underbrace{\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}}_{1/2} + \dots \geq 1 + \frac{1}{2} \lfloor \log_2 n \rfloor \Rightarrow$$
$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \Theta(\log n)$$

- **Про интегралы**

Формула Ньютона-Лейбница: $\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$

Пример: $\ln'(n) = \frac{1}{n} \Rightarrow \int_1^n \frac{1}{x} dx = \ln n - \ln 1 = \ln n$

$$\int_a^b \left[\min_{y \in [a..b]} f(y) \right] dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b \left[\max_{y \in [a..b]} f(y) \right] dx$$

Поэтому для монотонно убывающей $f(x)$ имеем $f(a) \geq \int_a^{a+1} f(x) dx \geq f(a+1)$.

А для монотонно возрастающей $f(x)$ имеем $f(a) \leq \int_a^{a+1} f(x) dx \leq f(a+1)$.

$$\lceil X(n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i}, \text{ значит, } X(n) - \frac{1}{n} = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{i} \geq \int_1^n \frac{1}{x} dx = \ln n \geq \sum_{i=2}^n \frac{1}{i} = X(n) - 1 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \ln n + \frac{1}{n} \leq X(n) \leq \ln n + 1 \Rightarrow X(n) = \ln n + \mathcal{O}(1)$$

2 Задачи про суммы

1. $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{n}{2^k} = n \cdot 2$
2. $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{n}{1.01^k} = n \cdot 101$
3. $\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^{k-1}} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{n} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} = X(2n) - \frac{1}{2}X(n) = \ln 2n - \frac{1}{2} \ln n + O(1) = \ln \sqrt{n} + O(1)$
4. $\prod_{k=2}^n (1 - k^{-2}) = \frac{n+1}{2n}$
5. $\prod_{k=1}^n (2 \cdot 4^k) = 2^{n(n+2)}$

3 Задачи про циклы for

Во всех задачах нужно ответить на вопрос “за сколько работает”:

1. Найти такие a, b, c : $abc = N$, $a + b + c = \min$. Решение:

```
1. for (a = 1; a <= N; a++)
2.     for (b = 1; a * b <= N; b++)
3.         c = N / a / b, ... ;
```

Ответ: $\mathcal{O}(N \log N)$

2. Поиск делителей без деления

```
1. b = N;
2. for (a = 1; a * a <= N; a++) {
3.     while (a * b > N)
4.         b--;
5.     if (a * b == N)
6.         printf("%d %d\n", a, b);
7. }
```

Ответ: $\mathcal{O}(N)$

3. Еще одно решение задачи (1)

```
1. for (a = 1; a * a * a <= N; a++)
2.     for (b = 1; b * b <= N; b++)
3.         c = N / a / b, ... ;
```

Ответ: $\mathcal{O}(N^{1/2}N^{1/3}) = \mathcal{O}(N^{5/6})$

4. (*) И еще одно решение задачи (1)

```
1. for (a = 1; a * a * a <= N; a++)
2.     for (b = a; a * b * b <= N; b++)
3.         c = N / a / b, ... ;
```

Ответ: $\mathcal{O}(N^{2/3})$

4 Домашнее задание

Дедлайн: 23.59 15 сентября

4.1 Задачи про циклы for

Дайте обоснование указанным оценкам.

1. Про строки

```
1. for (a = 1; a < n; a++)
2.     for (b = 0; b < n; b += a)
3.         ;
```

Ответ: $\mathcal{O}(N \log N)$

2. Partition

```
1. a = 1, b = n;
2. while (a < b) {
3.     while (x[a] < M && a <= b) a++;
4.     while (x[b] > M && a <= b) b--;
5.     if (a <= b) swap(x[a++], x[b--]);
6. }
```

Ответ: $\mathcal{O}(N)$

Дополнительный вопрос: что делает этот код?

3. Логарифмы

```
1. while (a >= 2)
2.     a = sqrt(a);
```

Ответ: $\mathcal{O}(\log \log N)$ Дополнительный вопрос: а если бы вместо 2 было бы 1?

4. Решето Эратосфена

```
1. for (p = 2; p < n; p++)
2.     if (min_divisor[p] == 0) // is prime
3.         for (x = p + p; x < n; x += p)
4.             if (min_divisor[x] == 0)
5.                 min_divisor[x] = p;
```

Ответ: $\mathcal{O}(N \log N)$

(*) Ответ: $\mathcal{O}(N \log \log N)$ (пользуемся не доказанным фактом: $p_n \approx n \ln n$)

5. Перестановки и циклы

```
1. for (i = 0; i < n; i++)
2.     if (used[i] == 0)
3.         for (j = i; used[j] == 0; j = (j*17+2) % n)
4.             used[j] = 1;
```

Ответ: $\mathcal{O}(N)$

4.2 Суммы

1. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{2^k}$

2. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^2}{2^k}$

3. Докажите, что $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^{3/2}} = \mathcal{O}(1)$

4. (*) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^{3/2}}{2^k}$