

Домашнее задание #7, 15.05

1. Дан набор линейно независимых векторов $v_1, \dots, v_m \in \mathbb{R}^n$, написать программу, которая

(16) Находит ортогональный базис $\text{Span}\{v_1, \dots, v_m\}$.

(16) Для симметричной матрицы $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ строит A -ортогональный базис $\text{Span}\{v_1, \dots, v_m\}$.

2. (26) Написать программу, которая строит многочлен степени n с младшим коэффициентом 1, имеющий наименьшую норму в $L_2([-1, 1])$, т. е. минимизировать по $\alpha_1, \dots, \alpha_n$

$$\int_{-1}^1 \left(1 + \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i \right)^2 dx$$

3. Написать программу, решающую систему

$$Ax = b$$

(26) Для квадратной симметричной положительно [полу-]определенной матрицы A с использованием метода сопряженных градиентов.

(26) Для произвольной вещественной матрицы A .

4. Реализовать класс для матриц [и векторов], позволяющий умножать матрицу на вектор за время $\mathcal{O}(n + m)$, где n – размер вектора, m – количество ненулевых элементов в матрице и решить с его помощью систему $Ax = b$ за $\mathcal{O}(nm)$

(26) Для квадратной симметричной положительно [полу-]определенной матрицы A с использованием метода сопряженных градиентов.

(16) Для произвольной вещественной матрицы A .

5. (26) Дан орграф $G = \langle V, E \rangle$, $|V| = n$, $|E| = m$ и вектор $\sigma \in \mathbb{R}^n$. Найти такой набор весов ребер $(\omega_{ij})_{(i,j) \in E}$, для которого выполняется

$$\sum_{j \in \text{in}(i)} \omega_{ji} - \sum_{j \in \text{out}(i)} \omega_{ij} = \sigma_i,$$

где $\text{in}(i)$, $\text{out}(i)$ – множества входящих в i и выходящих из i соответственно.